

Intervals of the Tamari lattice

Viviane Pons

Universität Wien

LRI, 28 mars 2014


Ordre faible

251436


Ordre faible

251436


Ordre faible




Ordre faible




Ordre faible





Ordre faible





Ordre faible





Ordre faible





Ordre faible






Ordre faible



Ordre faible



Permutoèdre




Treillis de Tamari

- ▶ 1962, Tamari : ordre sur les parenthésages formels
- ▶ 1972, Huang, Tamari : structure de treillis


Treillis de Tamari

- ▶ 1962, Tamari : ordre sur les parenthésages formels
- ▶ 1972, Huang, Tamari : structure de treillis

Arbres binaires




Rotation droite






Rotation droite









Rotation droite







Rotation droite








Rotation droite





Rotation droite





Rotation droite





Rotation droite





Rotation droite




Rotation droite




Rotation droite






Associaèdre




Associaèdre et permutoèdre



Lien avec l'ordre faible

Étiquetage canonique




Insertion dans un arbre binaire de recherche


4

15324 \rightarrow


Insertion dans un arbre binaire de recherche




Insertion dans un arbre binaire de recherche




Insertion dans un arbre binaire de recherche



Insertion dans un arbre binaire de recherche





Insertion dans un arbre binaire de recherche



Caractérisation : les permutations qui correspondent à un arbre donné sont ses extensions linéaires
15324, 31254, 35124, 51324, ...

Insertion dans un arbre binaire de recherche






Intervalles du treillis de Tamari

Chapoton 2007 : énumération des intervalles.

$$\frac{2}{n(n+1)} \binom{4n+1}{n-1}$$




Definition

Un intervalle-poset est un poset de taille n étiqueté par $1, \dots, n$ tel que

- Si $a < c$ et $a \triangleleft c$ alors $b \triangleleft c$ pour tout $a < b < c$.
- Si $a < c$ et $c \triangleleft a$ alors $b \triangleleft a$ pour tout $a < b < c$.

On note $a \triangleleft b$ pour a inférieur à b dans le poset.




Definition

Un intervalle-poset est un poset de taille n étiqueté par $1, \dots, n$ tel que

- Si $a < c$ et $a \triangleleft c$ alors $b \triangleleft c$ pour tout $a < b < c$.
- Si $a < c$ et $c \triangleleft a$ alors $b \triangleleft a$ pour tout $a < b < c$.

On note $a \triangleleft b$ pour a inférieur à b dans le poset.




Definition

Un intervalle-poset est un poset de taille n étiqueté par $1, \dots, n$ tel que

- Si $a < c$ et $a \triangleleft c$ alors $b \triangleleft c$ pour tout $a < b < c$.
- Si $a < c$ et $c \triangleleft a$ alors $b \triangleleft a$ pour tout $a < b < c$.

On note $a \triangleleft b$ pour a inférieur à b dans le poset.




Definition

Un intervalle-poset est un poset de taille n étiqueté par $1, \dots, n$ tel que

- Si $a < c$ et $a \triangleleft c$ alors $b \triangleleft c$ pour tout $a < b < c$.
- Si $a < c$ et $c \triangleleft a$ alors $b \triangleleft a$ pour tout $a < b < c$.

On note $a \triangleleft b$ pour a inférieur à b dans le poset.




Definition

Un intervalle-poset est un poset de taille n étiqueté par $1, \dots, n$ tel que


- Si $a < c$ et $a \triangleleft c$ alors $b \triangleleft c$ pour tout $a < b < c$.
- Si $a < c$ et $c \triangleleft a$ alors $b \triangleleft a$ pour tout $a < b < c$.

On note $a \triangleleft b$ pour a inférieur à b dans le poset.





Theorem (Châtel, P.)

Les intervalles-posets sont en bijection avec les intervalles du treillis de Tamari.





final forest $F_{\geq}(T)$






final forest $F_{\geq}(T)$







final forest $F_{\geq}(T)$




Initial forest $F_{\leq}(T)$






final forest $F_{\geq}(T)$




Initial forest $F_{\leq}(T)$










$F_{\leq}(T)$






$$F_{\geq}(T)$$


1 2 4
3





$$F_{\leq}(T')$$

2 3 4
|
1




$$F_{\geq}(T)$$









$$F_{\leq}(T')$$









Intervalle-poset
[T, T']




















































2




x^4




2





$$x^4 = x^2 \cdot x \cdot \frac{x^3}{x^2}$$




2





$$x^4 = x^2 \cdot \textcolor{red}{x} \cdot \frac{x^3}{x^2}$$




2



$$x^4 = x^2 \cdot x \cdot \frac{x^3}{x^2}$$



2



$$= x^3 \cdot x \cdot (1 + x + x^2 + x^3)$$

Theorem (Chapoton)

La série génératrice des intervalles de Tamari vérifie

$$\Phi(x, y) = B(\Phi, \Phi) + 1$$

où

$$B(f, g) = xyf(x, y) \frac{xg(x, y) - g(1, y)}{x - 1}$$

Polynômes de Tamari


On définit récursivement \mathcal{B}_T par

$$\mathcal{B}_\emptyset := 1$$

$$\mathcal{B}_T(x) := x\mathcal{B}_L(x) \frac{x\mathcal{B}_R(x) - \mathcal{B}_R(1)}{x - 1}$$

avec T

=



Theorem (Châtel, P.)

\mathcal{B}_T compte le nombre d'arbres inférieurs ou égaux à T dans le treillis de Tamari en fonction du nombre de nœuds sur leur branche gauche.

Polynômes de Tamari


On définit récursivement \mathcal{B}_T par

$$\mathcal{B}_\emptyset := 1$$

$$\mathcal{B}_T(x) := x \mathcal{B}_L(x) \frac{x \mathcal{B}_R(x) - \mathcal{B}_R(1)}{x - 1}$$

avec T

=



Theorem (Châtel, P.)

\mathcal{B}_T compte le nombre d'arbres inférieurs ou égaux à T dans le treillis de Tamari en fonction du nombre de nœuds sur leur branche gauche.

Polynômes de Tamari


On définit récursivement \mathcal{B}_T par

$$\mathcal{B}_\emptyset := 1$$

$$\mathcal{B}_T(x) := x\mathcal{B}_L(x) \frac{x\mathcal{B}_R(x) - \mathcal{B}_R(1)}{x - 1}$$

avec T

=



Theorem (Châtel, P.)

\mathcal{B}_T compte le nombre d'arbres inférieurs ou égaux à T dans le treillis de Tamari en fonction du nombre de nœuds sur leur branche gauche.



$$\mathcal{B}_{\emptyset} := 1$$

$$\mathcal{B}_T(x) := x \mathcal{B}_L(x) \frac{x \mathcal{B}_R(x) - \mathcal{B}_R(1)}{x - 1}$$



$$\mathcal{B}_{\emptyset} := 1$$

$$\mathcal{B}_T(x) := x \mathcal{B}_L(x) \frac{x \mathcal{B}_R(x) - \mathcal{B}_R(1)}{x - 1}$$

$$\mathcal{B}_L(x) = x^3 + x^2$$



$$\mathcal{B}_{\emptyset} := 1$$

$$\mathcal{B}_T(x) := x \mathcal{B}_L(x) \frac{x \mathcal{B}_R(x) - \mathcal{B}_R(1)}{x - 1}$$

$$\mathcal{B}_L(x) = x^3 + x^2$$

$$\mathcal{B}_R(x) = x^2$$



$$\mathcal{B}_{\emptyset} := 1$$



$$\mathcal{B}_T(x) := x(x^3 + x^2) \frac{x\mathcal{B}_R(x) - \mathcal{B}_R(1)}{x - 1}$$

$$\mathcal{B}_R(x) = x^2$$





$$\mathcal{B}_{\emptyset} := 1$$



$$\mathcal{B}_T(x) := x(x^3 + x^2)(1 + x + x^2)$$





$$\mathcal{B}_T(x) = x^3 + 2x^4 + 2x^5 + x^6$$





$$\mathcal{B}_T(x) = x^3 + 2x^4 + 2x^5 + x^6$$





$$\mathcal{B}_T(x) = x^3 + 2x^4 + 2x^5 + x^6$$



$$\mathcal{B}_T(x) = x^3 + 2x^4 + 2x^5 + x^6$$



$$\mathcal{B}_T(x) = x^3 + 2x^4 + 2x^5 + x^6$$



$$\mathcal{B}_T(x) = x^3 + 2x^4 + 2x^5 + x^6$$

$$\mathcal{B}_T(1) = 6$$

Quelques autres résultats et pistes...

- ▶ Lien avec les flots sur les arbres.
- ▶ Bijection avec les triangulations.
- ▶ Nouvelle involution sur les intervalles.
- ▶ Généralisation à m -Tamari.
- ▶ Mieux comprendre le treillis de Tamari et ses liens multiples avec d'autres théories ?